

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

DLP 26-7-65 399537

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 24 numéros par an

ÉDITION DE LA STATION DE STRASBOURG

Tél. 34-14-63 - Poste 93

(BAS-RHIN, HAUT-RHIN, MEURTHE-ET-MOSELLE, MOSELLE, VOSGES)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux : Cité Administrative, 2, Rue de l'Hôpital Militaire
STRASBOURG

C. C. P. : STRASBOURG 55-08-86

ABONNEMENT ANNUEL

15 F.

22 Juillet 1965

Supplément N°2 au bulletin du mois de Juillet 1965.

Avertissement

ARBRES FRUITIERS

- PRUNIERS -

CARPOCAPSE DES PRUNES

Dans les vergers où l'on craint habituellement des dégâts de Carpocapse des prunes, notamment sur les variétés Reine-Claude et Quetsche, on exécutera un traitement insecticide dans les derniers jours du mois de Juillet, de façon à protéger les fruits contre les attaques de deuxième génération.

On utilisera un produit jouissant d'une longue rémanence tel que l'Oléoparathion, l'Oléomalathion, l'Oléodiazinon ou encore le Carbaryl.

Tenir compte des limitations d'emploi de ces différents produits.

Information

MALADIES DU PRUNIER

Les conditions météorologiques de l'année ont été favorables au développement des maladies cryptogamiques et des dommages sensibles de Rouille et de Criblures des Feuilles peuvent s'observer dans les vergers de pruniers.

Afin de limiter l'extension de ces affections, il est conseillé d'effectuer une pulvérisation avec un fongicide de synthèse à base de Carbamate (Zinèbe, Zirame, T.M.T.D., etc..).

Ce traitement peut être combiné avec celui destiné à lutter contre le Carpocapse des prunes.

250 .../...

Avertissement

POMMES DE TERRE

MILDIOU DE LA POMME DE TERRE (Variétés sensibles)

Une nouvelle application devra être réalisée dans les premiers jours de la semaine à venir.

DORYPHORE

Dans certaines cultures, on note la présence abondante de larves. Profiter de la protection fongicide pour faire éventuellement un traitement mixte.

HOUBLON

MILDIOU

Dans les plantations insuffisamment protégées, le Mildiou est relativement fréquent. Compte tenu du temps actuel, toujours favorable au développement du champignon et de la nécessité de couvrir les hampes florales, particulièrement sensibles, il est indispensable d'exécuter un nouveau traitement dans la période du 24 au 27 Juillet.

Les Contrôleurs,
J. BERNARD et C. GACHON.

L'Inspecteur,
J. HARRANGER.

Imprimerie de la Station de Strasbourg
Directeur-Gérant : L. BOUYX.